



**СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
КЛИНИКА  
МАМОНТОВА Д.Д.**

Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЕСНЫ, Д. 2  
ТЕЛ. 8(391)2922020

## **Ответы на часто задаваемые вопросы**

### **• После операции появился сильный отек. Это нормально, что делать?**

*Появление отека – нормальный процесс, который может стать максимально выраженным на третьи сутки от момента операции. Чтобы убрать отек, следует в первые два часа прикладывать к щеке холодный компресс. Он сузит сосуды и минимизирует вероятность развития воспаления.*

### **• Не прекращается кровотечение, как быть?**

*При незначительном кровотечении можно не волноваться. Чтобы остановить кровь, приложите к ране тампон из стерильной марли и сожмите челюсти. В первый день старайтесь не жевать на больной стороне и не выполнять активные движения челюстью, иначе кровь может пойти с большей силой. Если через 3–5 часов после операционного вмешательства интенсивность кровотечения не снижается, обратитесь за медицинской помощью.*

### **• На второй и др. дни появляется небольшое кровотечение. Это нормально?**

*Комплексная реабилитация после имплантации зубов допускает случайное кровотечение в течение до 7 суток. В большинстве случаев оно прекращается уже на второй–третий день. Старайтесь спать на спине, поскольку поворот головы на бок способен привести к сдавливанию тканей и появлению крови. Если после подъема с кровати кровотечение не прекращается за несколько часов, нужно обратиться к хирургу имплантологу.*

### **• На лице появились гематомы. Как от них избавиться?**

*Гематомы – нередкое явление после операции, особенно при установке скуловых имплантатов или двухсоставных конструкций. Их можно заметить спустя 2–3 дня после процедуры. Гематомы возникают из-за травмирования сосудов и проходят по мере восстановления тканей. При необходимости используйте препараты, призванные рассасывать синяки.*

### **• После установки имплантов чувствуется онемение части лица, сложно говорить и открывать рот. Возможно ли повреждение нерва?**

*Чувство онемения возникает вследствие сдавливания или травмирования тройничного нерва. Если нерв не поврежден, то ощущения проходят самостоятельно в течение недели. При частичном повреждении нервных волокон онемение может беспокоить на протяжении длительного времени – от двух недель до полугода. Сильная травма тройничного нерва потребует переустановки имплантатов.*

### **• Сколько времени заживают ранки и приживаются импланты?**

*На начальной стадии реабилитационного периода заживают мягкие ткани. Весь процесс может происходить около одной недели. На втором этапе начинается остеоинтеграция (вживление имплантатов в кость). В среднем на это уходит 3–6 месяцев, но при сложных операциях приживаемость зубных имплантатов может затянуться на срок до одного года.*

### **• Обязательно ли принимать антибиотики?**

*Антибиотики назначают при обширной операции, затрагивающей большие участки зубного ряда. Также их следует принимать пациентам, имплантация у которых проводилась на фоне парадонтита или воспаления.*

### **• В течение нескольких дней повышена температура. Что делать?**

*В первые трое суток после операции температура может подниматься до 39°. Это нормально, волноваться не стоит. Если температуры не было, а затем она резко поднялась, следует сразу обратиться к доктору.*

**• Когда снимают швы?**

*Врачи нашей клиники используют для ушивания как резорбируемые нити, так и не резорбируемые. Первые рассасываются самостоятельно, поэтому снимать их не нужно. Но спустя несколько дней после имплантации следует показаться стоматологу для оценки текущего состояния. Вторые нити нужно снимать через 7 -14 дней после проведенной процедуры. Детали Вам сообщит доктор.*